

Figure 1

Au moins 1 Facteur de risque :
âge \geq 35 ans
ou IMC \geq 25kg/m²
ou ATCD familiaux de diabète au 1^o
ou ATCD personnel de DG
ou ATCD de macrosomie

SFD
CNGOF

A poursuivre

Début de grossesse

Non

Oui

Mesure de la GAJ

GAJ $<$ 0,92 g/l

0,92-1,25 g/l

\geq 1,26 g/l

DG précoce

Diabète avéré découvert pendant la grossesse

Prise en charge immédiate du DG

24-28 SA

Charge orale en glucose 75 g

GAJ $<$ 0,92 g/l
et G1h $<$ 1,80 g/l
et G2h $<$ 1,53 g/l

GAJ 0,92-1,25 g/l
ou G1h \geq 1,80 g/l
ou G2h 1,53-1,99 g/l

GAJ \geq 1,26 g/l
ou
G2H \geq 2,0 g/l

DG (tardif)

Diabète avéré découvert pendant la grossesse

Pas de DG

Prise en charge immédiate du DG

Prise en charge immédiate + bilan diabète

$>$ 28 SA

Découverte macrosomie ou hydramnios

Non

Oui

Charge orale en glucose 75 g

Figure 2

Au moins 1 Facteur de risque :
âge \geq 35 ans
ou IMC \geq 25kg/m²
ou ATCD familiaux de diabète au 1^o
ou ATCD personnel de DG
ou ATCD de macrosomie

**Si HGPO impossible
Ou refus des patientes**

